



EMULSIÓN FLUIDA INDICADA PARA EL  
TRATAMIENTO DE PIELS LESIONADAS O DAÑADAS

**CORPITOL**  
LECHE



### Corpitol® leche

Es una nueva emulsión fluida reparadora hipoalergénica compuesta de ácidos grasos esenciales hiperoxigenados (ácido linoleico 60%) cuya fórmula no contiene conservantes (parabenos).



### Corpitol® leche

Ha sido específicamente formulado y desarrollado para el tratamiento de las pieles dañadas o lesionadas.



### Corpitol® leche

Tubo Airbackless.

TAMAÑOS	U/C	REF.
Tubo de 40 g	1	505045



## COMPOSICIÓN

Glicéridos hiperoxigenados de ácidos grasos esenciales (ácido linoleico al 60%), acetato de tocoferol (vitamina E), fragancia de pomelo y excipientes.

**Corpitol® leche**, a causa de su composición de ácidos grasos esenciales hiperoxigenados y de su riqueza en ácido linoleico (60%) presenta las siguientes propiedades protectoras hidratantes, calmantes y cicatrizantes de la epidermis:

- Mejora de la troficidad cutánea (flexibilidad-firmeza-hidratación).
- Efecto calmante al picor por su galénica específica.
- Efecto cicatrizante de las alteraciones superficiales del revestimiento cutáneo (ácido linoleico).



## PROPIEDADES

**Corpitol® leche**, gracias a su composición en ácidos grasos esenciales hiperoxigenados y a su riqueza en ácido linoleico, refuerza la acción barrera epidérmica creando un microentorno hidrolipídico favorable al mantenimiento de la troficidad cutánea. De esta forma:

- **Corpitol® leche** corrige la sequedad cutánea limitando la pérdida de agua transepidérmica por su efecto barrera.
- **Corpitol® leche** favorece la cicatrización de las alteraciones superficiales de la piel por fricción o descamación excesiva.



## INDICACIONES

**Corpitol® leche**, está indicado en el tratamiento:

- De las alteraciones de la integridad cutánea: piel seca, frágil, fina y escamosa, en las personas de edad avanzada.
- De las atrofiás cutáneas de insuficiencias vasculares de los miembros inferiores (insuficiencia venosa crónica) o de origen yatrógeno (corticoterapia general, quimioterapia).
- De las alteraciones epidérmicas perilesionales de las úlceras de pierna (dermatitis de estasis).
- De las dermatitis irritativas con prurito, secundarias a estados de gran sequedad cutánea (xerosis).
- De las alteraciones de la hidratación cutánea con sequedad, fisuras e hiperqueratosis localizada sobre todo en el paciente diabético.



## CONTRAINDICACIONES

- Lesión cutánea infectada o con alto riesgo de infección.



## PRECAUCIONES

- No dejar al alcance de los niños.
- No ingerir - Uso externo.
- Dejar penetrar **Corpitol® leche** antes de la colocación de un sistema de compresión o de un apósito secundario.



## MODO DE EMPLEO

- Aplicar **Corpitol® leche** en una fina capa en la cantidad necesaria, sobre la piel.
- Delicadamente lo distribuiremos con la yema de los dedos para facilitar la penetración del producto.
- Renovar la aplicación de 2 a 3 veces al día si fuese necesario.
- **Corpitol® leche** es compatible con la aplicación de un sistema de compresión y la colocación de un apósito secundario.



## ESTADO REGLAMENTARIO

- Mercado CE-0459.
- Producto sanitario de clase II a.